

जागतिक हवामान बदलाच्या संकटामध्ये हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि कार्बन संचय वाढविण्यासाठी प्रभावी धोरणांची त्वरित ओळख तसेच अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याची आणि साठवण्याची अंतर्निहित क्षमता असलेल्या विविध नैसर्गिक परिसंस्था या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या महत्त्वाच्या परिसंस्थांपैकी कांदळवनांची जंगले उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशांमध्ये जमीन आणि समुद्र यांच्यातील आंतरभरती क्षेत्रांमध्ये स्थित अद्वितीय किनारी परिसंस्था म्हणून ओळखली जातात. खाऱ्या पाण्यात वाढण्याची त्यांची उल्लेखनीय क्षमता आणि त्यांच्या मुळांच्या वैशिष्ट्यीकृत गुंतागुंतीच्या जाळ्याद्वारे, ही कांदळवने विविध सागरी जीवनांना आधार देण्यापासून ते किनारी समुद्रायांसाठी उपजीविका प्रदान करण्यापर्यंत अनेक पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे देतात. वादळ आणि धूप यांच्या तीव्र परिणामांपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करण्याची त्यांची क्षमता या परिसंस्थेची लवचिकता वाढवते. जागतिक हवामान बदलांशी लढण्यासाठी या कांदळवनांचे अन्न्यसाधारण महत्त्व आहे.

- डॉ. सुशांत विलास सनये,

महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान, मुंबई



ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये कांदळवनांचे सुरक्षा कवच

कार्बन सिक' म्हणून महत्त्व

कांदळवनांमध्ये कार्बन साठवण्याची प्रक्रिया ही एक अत्यंत कार्यक्षम नैसर्गिक यंत्रणा आहे. प्रकृतासंरक्षणद्वारे ही शाई वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात. नंतर या साठवलेल्या कार्बनचा वापर सेंडिंग पदार्थ तयार करण्यासाठी केला जातो, जो कांदळवन परिसंस्थेच्या विविध भागांमध्ये साठवला जातो. यामध्ये मुख्यतः झाडे (पाने, रेंड, फांदी आणि मुळे) आणि सभोवतालच्या मातीचा समावेश आहे, ज्याला 'गाळ' म्हणतात. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, कांदळवनांपैकील कार्बनचा एक महत्त्वपूर्ण भाग जमिनीखालील मातीत आणि मूळ मुळांमध्ये वाटल्या आणि साठवला जातो, ज्यामुळे दीर्घकालीन तसेच अधिक स्थिर कार्बन साठा निर्माण होतो.

'ब्लू कार्बन' किंवा 'नील कार्बन' हा शब्द विशेषतः किनारी आणि सागरी परिसंस्थांबाबत साठवलेल्या कार्बनबाबत वापरला जातो. यामध्ये कांदळवने, खाऱ्या इलदले आणि समुद्री गवताच्या अधिसंस्थांचा समावेश आहे. या परिसंस्थांमध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे साठवण करीत जाते, जे नंतर त्यांच्या अंगामध्ये आणि सजीव महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या मातीत आणि गाळ्यात साठविले जाते. अद्वितीय मूळ प्रणालीच्या संयोजनाने कांदळवने प्रभावीपणे नील कार्बन परिसंस्था म्हणून काम करतात. या गुंतागुंतीच्या मुळांच्या रचनेत केवळ झाडांना आधार देत नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात गाळदेखील अडकवतात, ज्यामुळे कार्बन-समृद्ध सेंडिंग पदार्थाचे संचयन सुलभ होते. शिवाय, खाऱ्या पाण्याने भारलेल्या गाळामध्ये कांदळवनांची वाढ होते, ती माती सापळते: अंतर्गोचक असते, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी खूप कमी असते. ऑक्सिजनची कमतरता सेंडिंग पदार्थाच्या विघटन



प्रक्रियेला लवचिकपणे मंदीत करते. यामुळे साठवलेला कार्बन शेकडो ते हजारो वर्षे सांठवू शकतो. इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी कार्बन साठवण्याची ही क्षमता दीर्घकालीन हवामान बदल कमी करण्यात कांदळवनांच्या महत्त्वापूर्ण भूमिकेचा प्रकाश टाकते. जरी कांदळवने पूर्वीच्या पृष्ठाण्याच्या तुलनेने कमी टक्केवारी व्यापत असले (अंदाजे ०.१ टक्के) आणि जगातील जंगलांबाहेरील एकाच कार्बन संचयनाच्या केवळ १ टक्का तरी जागतिक महासागरातील कार्बन संचयनात त्यांचे योगदान लक्षात घेव्हा असे १४ टक्के आहे.

सर्वसाधारणपणे किनारी पणथळ जगात कार्बन

जैवविविधता सावरणारी ध्यवस्था

कांदळवन परिसंस्था त्यांच्या समृद्ध जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्या जलचर, अर्ध-जलचर आणि स्थलीय प्रजातींना आवश्यक ती अधिवास प्रदान करतात आणि त्यांना आधार देतात. कांदळवन जंगलांच्या जटिल मूळ प्रणाली आणि दारू आच्छादनामुळे मासे, खेकडे, कोळंबी आणि इतर सागरी जीवांच्या असंख्य प्रजातींसाठी आश्रयस्थाने तयार होतात, ज्यापैकी अनेक व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. जलचारांशिवाय या परिसंस्था विविध पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि सस्तन प्राण्यांसाठी महत्त्वपूर्ण खाद्य आणि प्रजनन क्षेत्र म्हणूनदेखील काम करतात. कांदळवन परिसंस्था त्यांच्यामध्ये समाविष्ट जैवविविधतेला हवामान बदलांना तोंड देताना त्यांना सावरण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देते. शिवाय कांदळवन किनारी पाण्यातील गाळ आणि प्रदूषकांना गाळ मावण्यापासून आणि पोषक तत्वांच्या अतिरिक्तपासून संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे व्यापक परस्परसंबंध किनारी परिसंस्थांच्या आरोग्यासाठी आणि उत्पादकांसाठी कांदळवनांचे महत्त्व अधोर्गहित करतात. निरोगी आणि वैविध्यपूर्ण कांदळवन समुद्रायांची ठरविली किनारी आणि किनार्यावरील दोन्ही मजबूत पर्यावरणीय परिस्थिती दर्शवते, ज्यामुळे किनारी वातावरणाचे एकूण आरोग्य आणि स्थिरता वाढते. म्हणूनच, कांदळवनच्या जंगलांचे संरक्षण आणि पुनर्संचयित करणे ही जैवविविधता राखण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना किनारी परिसंस्थांची लवचिकता वाढविण्यासाठी एक महत्त्वाची रणनीती आहे.

साठवण्यात इतर परिसंस्थांच्या तुलनेत खूप कार्यक्षम आहेत आणि कांदळवनांच्या गाळ्यात साठवलेल्या कार्बनची टोपकालीन स्थिरता ही हवामान बदलाशी लढाईतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. जमिनीवरील जंगलातील साठवलेल्या कार्बनच्या विपरीत, जो अग्न किंवा जंगलशेवट यांसारख्या घटनांपेक्षा सहजपणे बाहेर सोडल्या जाऊ शकतो, कांदळवन जंगलांच्या अंतर्गोचक मातीत खोलवर गाडलेला कार्बन शलकायुक्त किंवा अगदी महासागरीपर्यंत सक्रिय कार्बन चक्रापासून वेगळा राहतो. दीर्घकाळ वातावरणातून लक्षणीय प्रमाणात हरितगृह वायू प्रभावाचे काढून टाकण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे

कांदळवने हवामान नियंत्रण महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

सुरक्षेसाठी नैसर्गिक भिंत

कार्बन शोषणात त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेपाठोपाठ, कांदळवन परिसंस्था वादळ, लाटा आणि धूप यांसारख्या कडक पोहोचणार्या किनारपट्टीला संरक्षण प्रदान करतात, जे दोन्ही हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे तीव्र होतात. कांदळवन झाडांच्या दारू आणि गुंतागुंतीच्या मुळांच्या प्रणाली नैसर्गिक अडथळ्यांसारखे काम करतात व लाटा आणि वादळ लाटांची ऊर्जा प्रभावीपणे

शोषून घेतात आणि नष्ट करतात. लाटा मुळांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यातून जात असताना, घर्षणामुळे त्यांची ऊर्जा कमी होते, ज्यामुळे त्यांची शक्ती आणि उंची लक्षणीयरीत्या कमी होते. ही लाटा कमी करण्याची क्षमता किनारी क्षेत्रांना महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करते. पुराची तीव्रता कमी करते आणि पुराचे पाणी हळूहळू कमी होण्यास मदत करते. महाग्रहण राण्यामध्ये असलेल्या 'फर्न', 'मिल' यांसारख्या वाईटवादांचा प्रभाव कमी करण्यामध्ये कांदळवनांची मुख्य भूमिका असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे.

कांदळवनांच्या मुळांच्या प्रणाली किनारी गाळ स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यामुळे लांब वादळे आणि धूप घटनांमध्ये वादळ आणि मातीची धूप रोखली जाते. पायबटिरीज कांदळवने यदा आणि यदातून वादळ नेह्या बाधण्या गाळचे सुलभ संचयन करतात. कालांतराने किनार्याची उंची हळूहळू वाढण्यास हातभार लावतात. ही प्रक्रिया किनारपट्टी अखंड राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या बाधण्या पातळीमुळे होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांना किनारी क्षेत्रात कमीत कमी नुकते. कांदळवनांच्याद्वारे, पातळ्या पूर्व किनारपट्टीला २००० वर्षे अतिसूक्ष्म लुप्तप्राय प्रजातींच्या कांदळवनात देख होते, त्या गाळामध्ये मुसलीचा प्रभाव कमी दिसून आला. लाटांची ऊर्जा कमी करण्याची गाळ स्थिर करण्याची आणि किनार्यावरील बाढीस हातभार लावण्याची कांदळवनांची क्षमता त्यांना हवामान बदल-प्रतिकार किनारी पोहोचणारे निसर्ग होणाऱ्या बाधण्या पोहोचविण्यात एक महत्त्वाची नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा बनवते.

हवामान बदलावरचा प्रभाव

हवामान बदल कमी करण्यात कांदळवनांची महत्त्वाची भूमिका असून, कांदळवन परिसंस्था

असंख्य फायदे आहेत, ज्यामुळे जगातील स्थिर यत्नात आणि अन्न पटल होत आहे. कांदळवनांचे तोंड ही त्यांच्या नुकसानांचे एक प्रमुख कारण आहे. मावण्यातून (मिशेल: कोळंबी घाला). मोती, किनारी विकसन (कोची बंदी, हॉलिवूड आणि पाचपुल सुटिंग)। आणि तांदूळ साठवण विविध जैवविविधता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सात केले जात आहेत. कोळंबी चालण्याच्या कृत्रिम तलावांसाठी कांदळवनांच्या क्षेत्रांचा मोठा भाग नष्ट झाला आहे. हा बायोसिकल मलायन मॉडेल सावकाश रीत्या मान्यता मिळते. तसेच बायोसिकल आणि वन जंगल जंगलवर्दीत इतर विकारां होण्यातूनही कांदळवनांच्या क्षेत्रावरील हातापा लावले. फलन आणि पाचपुल सुटिंगसाठी किनारी विकसनमुळे अनेकदा कांदळवनाच्या अधिवासाचे वेगळे उच्चाटन किंवा नष्ट होतो.

विविध मजगतातून प्रत्येककाचे कांदळवनांसाठी सारांश रीत्या आणि यंत्रणेने मोठे योगदान दिलेले. पायबटिरीज प्रत्येककाचे कांदळवनांच्या जंगलातील सारांश रीत्या व यदा अडथळा ठरवतो आणि त्याचे प्रभाव होत आहेत. कोळंबी, कोणी आणि इतर अद्वितीय राखणीला वादळ बाधण्या पाण्याचे प्रदूषण कांदळवनांच्या प्रदान विकसन किंवा इतर. विकसन किनारी पातळ बाधण्याच्या बाधण्या वादळामुळे होणारी तेज पातळीवरील कांदळवनांच्या अतिरिक्तप्राप्ती रीत्या रीत्या मिळते करते.

वैविध्य हवामान बदल हा महा: कांदळवन परिसंस्थांसाठी एक वाढत पोसा आहे. समुद्राच्या पातळीचा वाढ झाल्याने कांदळवने त्यांच्या सतततालेखन स्फुरीतरीतके धुवू लागतात. विशेषतः किनारी विकसनमुळे त्या बाधात येतीलकडे पान १४ व १५

